

Medicinas para resfrio

Medicina	Puede dar cada	14-17 lbs. 6-11 mes	18-23 lbs. 12-23 mes	24-35 lbs. 2-3 anos	36-47 lbs. 4-5 anos	48-59 lbs. 6-8 anos	60-85 lbs. 9-11 anos
Benadryl Syrup	6 horas	No utilice	No utilice	1 1/2 tsp.	1 3/4 tsp.	2 tsp.	2 tsp.
Dallergy Syrup	4 - 6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1/2 tsp.	1 tsp.	1 1/2tsp.
Dimetapp Elixir	6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1 1/2 tsp.	2 tsp.	3 tsp.
Nyquil (purple) Syrup	4 - 6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1-1/2 tsp.	2 tsp.	3 tsp.
Pediacare Cough-Cold Syrup	4 - 6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1 1/2 tsp.	2 tsp.	2 1/2 tsp.
Sudafed Syrup	6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	3/4 tsp.	1 tsp.	1 1/2 tsp.

* PRECAUCIÓN: le recomendamos que use el gotero o la copa de dosificación que viene con su medicamento para evitar la sobredosis. Las recomendaciones de dosificación en botellas pueden variar de la recomendación en estas páginas. Nos gustaría que use nuestras dosificaciones recomendadas a menos que su proveedor de atención médica le haya dado una dosis diferente. La aspirina no debe administrarse a su hijo.