

**¡IMPORTANTE! POR FAVOR, LEA:** La FDA reconoce que los ingredientes en estos productos para la tos y el resfriado no han sido probados por los estándares actuales para identificar sus niveles de eficacia y seguridad. Si bien hay más estudios pendientes, los fabricantes están volviendo a etiquetar voluntariamente el uso recomendado de estos productos para "No utilizar" en niños menores de 6 años. Dada la necesidad de realizar más investigaciones, las dosis que se enumeran a continuación son las recomendaciones actuales de nuestra oficina.

## Medicinas para tos

Puede dar cada	14-17 lbs. 6-11 mes	18-23 lbs. 12-23 mes	24-35 lbs. 2-3 años	36-47 lbs. 4-5 años	48-59 lbs. 6-8 años	60-85 lbs. 9-11 años
<b>Benylin DM Syrup</b>	6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1 3/4 tsp.	2 tsp.
<b>Delsym Syrup</b>	12 horas	No utilice	No utilice	No utilice	3/4 tsp.	1 tsp.
<b>Dimetapp DM</b>	6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1 1/2 tsp.	2 tsp.
<b>Donatussin Syrup</b>	4 - 6 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1/4 tsp.	1/2 tsp.
<b>Robitussin DM Syrup</b>	4 horas	No utilice	No utilice	No utilice	1/2 tsp.	1 tsp.

\* PRECAUCIÓN: le recomendamos que use el gotero o la copa de dosificación que viene con su medicamento para evitar la sobredosis. Las recomendaciones de dosificación en botellas pueden variar de la recomendación en estas páginas. Nos gustaría que use nuestras dosificaciones recomendadas a menos que su proveedor de atención médica le haya dado una dosis diferente. La aspirina no debe administrarse a su hijo.